

周 產 期 會 訊



發行人：陳持平 秘書長：徐振傑 會訊主編：施景中

郵政劃撥帳號：12420668 戶名：中華民國周產期醫學會

會址：台北市常德街一號 電話：(02)2381-6198 傳真：(02)2381-4234

http: www.taiwanperina.org.tw

第九十六期

2004 年 2 月

在產後大出血後併發冠狀動脈疾病 及心肌梗塞及猛爆性肝炎

三軍總醫院 鍾國騰

產後大出血在目前還是造成母親死亡的重要原因，其定義為生產後出血超過五百毫升，在發展中國家產後大出血的盛行率為 1-6%。根據世界衛生組織估計每年有 25% 的母親死亡率和嚴重的產後出血有關。造成產後大出血的原因包括子宮收縮不良、產道撕裂傷、胎盤滯留、子宮翻出、先天或後天的凝血功能異常。治療產後大出血的方式包括按摩子宮、使用促進子宮收縮的藥物、縫合產道的撕裂傷、單側或雙側的腸骨內動脈或子宮動脈拴塞術，甚至子宮全切除手術。急性心肌梗塞在產後大出血之後發生的非常的少，可能是由於冠狀動脈痙攣或病人本來就合併冠狀動脈疾病所引起，Taylor et al.曾經報導過一使用子宮收縮素引產因促進冠狀動脈痙攣而造成心肌梗塞的例子。懷孕時合併心肌梗塞常引起母親的高致死率。此次病例為一個因子宮收縮不良所引起之產後大出血並且合併急性心肌前下壁梗塞，冠狀動脈血管攝影顯示冠狀動脈左降支約有 75% 狹窄及在右冠狀動脈的遠端部分約有 80% 的狹窄，在做完經皮冠狀動脈氣球擴張術及放置血管支架後，心肌梗塞被成功的治療。至於造成產後出血併發心肌梗塞的原因，除了使用子宮收縮素外，產後出血造成冠狀血管供血不良以致心肌供氧量不足亦可能是另一重要原因。

2004 年 3 月份月例會取消

特此公告

周產期醫學會學術研討會

—2004 年 4 月份—

(歡迎醫護人員免費參加)

- 時 間：2004 年 4 月 17 日 (星期六) 早上 7:30 ~ 8:30
地 點：台北馬偕醫院 15 樓階梯教室 (台北市中山北路 2 段 92 號)
主 持 人：陳持平 理事長、謝景璋 副理事長、徐振傑 秘書長
主 講 者：Torbjörn Tomson
Department of Clinical Neuroscience, Karolinska institute, Stockholm,
Sweden
題 目：Teratogenic effects of antiepileptic drugs and the importance of
pregnancy registries
積 分：婦產科醫學會 B 類 1 分

中華民國周產期醫學會

印刷品

100

台北市常德街一號

電話：(02)2381-6198

傳真：(02)2381-4234