

周 產 期 會 訊



發行人：陳持平 秘書長：徐振傑 會訊主編：施景中

郵政劃撥帳號：12420668 戶名：中華民國周產期醫學會

會址：台北市常德街一號 電話：(02)2381-6198 傳真：(02)2381-4234

http: www.taiwanperina.org.tw

第一〇〇期 2004年6月

妊娠高血壓併腹水安胎生產

新光醫院婦產科 潘恆新

摘要

妊娠高血壓併腹水在臨床上並不多見，在 1949 年 Golden 首次提出此一案例報告，至今仍有一些零星的報告。一般學者皆認為一旦妊娠高血壓併腹水出現，有可能演變成 HELLP Syndrome，約 10%，故建議中止妊娠，但在考量胎兒成熟度方面，若能控制血壓及孕婦所產生的症狀，並加速胎兒肺部成熟再引產，對孕婦及胎兒的預後可能有所助益。今報告一妊娠 31 週併產前腹水，妊娠高血壓，以抽取腹水方式減緩孕婦症狀之案例報告。

此 41 歲之婦女，G₅P₂AA₂，經外院診斷為妊娠高血壓，當時主訴頭痛、高血壓、視力模糊，經檢查發現血壓 158/100mmHg，體重 60 公斤，雙腿腳踝水腫，尿糖、尿蛋白呈現 2 價，肝功能、血小板指數正常，此時懷孕週數約 27⁺⁵週。建議住院控制血壓，但病人希望以藥物控制，在解釋過其併發症並充份瞭解後，約定每週追蹤，經過 7 天後(28⁺⁵週)，血壓 150/100mmHg，腹圍約 36 週之大小，經超音波顯示，此孕婦有羊水過少，胎兒體重過輕，並且有腹水出現。孕婦主訴呼吸困難，食不下嚥。經解釋後以 20 號針頭在超音波引導下引流出 1000c.c.之腹水。經送檢發現無癌細胞，無菌之清澈腹水。其後，病人於 30 週時，再次有同樣的主訴：腹脹、呼吸不舒服、血壓高、體重增加快速，此時經強烈要求住院安胎控制血壓，再次抽取出 1300c.c.之腹水，並於妊娠 31 週時，以剖腹產方式生下一體重達 1020 公克之女嬰。腹水約流出 1500c.c.，胎盤重 350gm，術後血壓控制良好，於術後第四天出院。

結論

妊娠高血壓併腹水產生，若在嚴格的血壓控制下，再經腹水引流術，或許可以延長孕婦生產之週數，但必須極度小心妊娠高血壓所帶來的併發症。

台灣中部地區學術研討會

—2004 年 7 月份—

(歡迎醫護人員踴躍參加)

主辦單位：中華民國周產期醫學會

協辦單位：台中榮民總醫院婦產部、生寶臍帶血銀行、

時 間：2004 年 7 月 10 日 (星期六) 下午 1:30 ~ 5:00

地 點：台中榮民總醫院—第二醫療婦幼大樓 2 樓—婦產部會議室

主 持 人：Dr.陳持平、周明明、李建忠

時 間	題 目	主 講 者
1:30 ~ 2:00	生子生物細胞遺傳學在產前診斷的應用	台北馬偕—Dr.陳持平
2:00 ~ 2:30	妊娠 11-14 週的超音波掃描	彰化基督教—Dr.謝聰哲
2:30 ~ 3:00	產科醫師於醫療糾紛發生時自保之道	台中榮總—Dr.周明明
3:00 ~ 3:30	<i>Coffee Break</i>	
3:30 ~ 4:00	EXIT 胎兒手術的臨床經驗	台大醫院—Dr.施景中
4:00 ~ 4:30	產後大出血的治療新方法—淺談 B-Lynch 子宮縫合	台中中國—Dr.李建忠
4:30 ~ 5:00	臍帶血幹細胞複製及技術運用	生寶臍帶血—陳位存 副總

積 分：婦產科醫學會 B 類 4 分

周產期醫學會學術研討會

—2004 年 7 月份—

(歡迎醫護人員免費參加)

時 間：2004 年 7 月 17 日 (星期六) 早上 7:30 ~ 8:30

地 點：台北馬偕醫院—平安樓 12 樓 12C 病房醫師研究室

主 持 人：陳持平 理事長、謝景璋 副理事長、徐振傑 秘書長

主 講 者：國泰醫院—鄭志堅 醫師

題 目：Fetal Doppler and Fetal Anemia

積 分：婦產科醫學會 B 類 1 分

活動預告

- (一) 請各位會員踴躍報名參加台日周產期懇談會。
- (二) 9月11日及10月23日舉辦北區護理人員教育課程。

報名方式：索取相關資料請上學會網站下載

中華民國周產期醫學會

100

台北市常德街一號

電話：(02)2381-6198

傳真：(02)2381-4234

印刷品